

Peru/ペルー

Vaccination Schedule of the Child

子どもの予防接種スケジュール

	BCG BCG	Polio ポリオ	Three types mixed 3種混合*	Measles 麻疹**	Hepatitis B B型肝炎	Haemophilus influenza Type b Hib***
1st time 1回目	At birth 出生時	2nd month 2ヶ月	2nd month 2ヶ月	12th-17th month 12-17ヶ月	None なし	2nd month 2ヶ月
2nd time 2回目		4th month 4ヶ月	4th month 4ヶ月	Sixth year 6歳		4th month 4ヶ月
3rd time 3回目		6th month 6ヶ月	6th month 6ヶ月			6th month 6ヶ月
4th time 4回目		18th month 18ヶ月	18th month 18ヶ月			1st year 1歳
5th time 5回目		4th-6th year 4 - 6歳	4th-6th year 4 - 6歳			

*diphtheria / pertussis / tetanus

**Measles vaccine or MMR vaccine (Measles, Mumps and Rubella)

***Haemophilus influenzae Type b

*ジフテリア、百日咳、破傷風

** 麻疹ワクチンあるいはMMRワクチン (麻疹、風疹、おたふくかぜ)

*** Hib (インフルエンザb菌ワクチン)

Important Notices for Each Vaccine

個々のワクチンに関する留意事項

- 1) For BCG, a tuberculin test is not held and BCG is directly inoculated.
- 2) An oral polio vaccine is used. However, in Peru on NID (National Immunization Day), all infants under five are given the polio vaccine regardless of whether they've had it before or not. Because of that, it is not uncommon for children to have received the polio vaccine nearly ten times between scheduled vaccinations and NID.
- 3) The three types mixed vaccine is an improved whooping cough vaccine, and there are mostly no side effects.
- 4) Instead of the measles vaccine, MMR is used.
- 5) The Hepatitis B vaccine is administered only at some hospitals

- (1) BCGは、ツベルクリン反応検査を行わず、直接BCGを接種している。
- (2) ポリオは、ほとんどが経口ワクチンを使用している。ペルーではNID(National Immunization Day)といって、ワクチン接種の有無にかかわらず、すべての5歳未満児にポリオワクチンの全国一斉投与を行った。そのため、定期接種とNIDの両方を律儀に受けた子どもの中には、10回近くポリオワクチンの投与を受けた子どもが少なくない。
- (3) 3種混合は、改良百日ぜきワクチンを使用しており、副作用は少ない。
- (4) 麻疹ワクチンではなく、MMRを使用している。
- (5) B型肝炎は、一部の病院では実施している。

Note

None

特記事項

とくになし